

## Wirkung von Herbiziden auf Leitunkräuter in Winterraps-Frühjahr (Auswahl)

Mittel	Wirkstoff(e)	HRAC- Einstufung <sup>4)</sup>	Aufwand- menge je ha	Preis/ha <sup>1)</sup> EUR	Bemerkung	Klettenlabkraut	Kamille	Vogelmiere	Taubnessel	Ehrenpreis	Besenrauke	Hirtentäschel, Hellerkraut	Klatschmohn	Ausfallgetreide	Abstände zu Oberflächen- gewässern in m <sup>2)</sup>	Abstände zu Gewässern bei Abtragsgefahr in m <sup>3)</sup>	
<b>Effigo</b>	Picloram +Clopyralid	O	0,35 l	55,30	bis Knospen- stadium (ES 50)	+++	+++	-	-	+	-	+	+	-	1	-	-
<b>Barca 334 SL</b>	Picloram +Clopyralid	O	0,35 l	29,40	bis ES 31; 1. sichtbar ge- strecktes Internodium	+++	+++	-	-	+	-	+	+	-	1	-	-
<b>Cliophar 600 SL/ Lontrel 600</b>	Clopyralid	O	0,2 l + 2 l Öl	70,80/ 67,50	NA	-	+++	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>Korvetto</b>	Haluxifen-methyl + Clopyralid	O	1,0 l	46,00	ab Vegetations- beginn bis Knospen- stadium (ES 50)	+++	+++	+	+++	+	++(+)	+	++(+)	-	1	-	-
<b>Lontrel 720 SG</b>	Clopyralid	O	167 g + 2 l Öl	74,00	NA	-	+++	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>Vivendi 200</b>	Clopyralid	O	0,5-1,0 l	32,90-65,70	NA	-	+++	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
<b>Gräserherbizide</b>																	
<b>Agil-S/Zetrola</b>	Propaquizafop	A	0,7-1,0 l	24,50-34,90/ 24,70-35,30	NA ab 3-Blatt der Gräser	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	1	-	-
<b>Focus ultra<sup>5)</sup></b>	Cycloxydim	A	1,5 - 2 l	39,70-52,90		-	-	-	-	-	-	-	-	+++	1	-	-
<b>Fusilade MAX</b>	Fluazifop-P	A	1,0 l	28,20		-	-	-	-	-	-	-	-	+++	1	n.z.	
<b>Grasser 100 EC</b>	Quizalofop-p	A	0,6 l	23,10		-	-	-	-	-	-	-	-	+++	1	-	-
<b>Panarex</b>	Quizalofop-p-tefuryl	A	1,25 l	28,20		-	-	-	-	-	-	-	-	+++	1	-	-
<b>Targa super</b>	Quizalofop-p-ethyl	A	0,5 + 2 l Öl	38,80		-	-	-	-	-	-	-	-	+++	1	-	-

1) Preisbasis: unverb. empf. Listenpreise 2020 exkl. MwSt., größte Verpackungseinheit

2) Regelabstand/50/75/90 % Abtriftminderungsklasse

3) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und wenn angegeben ein bewachsener Grünstreifen (mit G und Meterangabe-gekennzeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im Nachauflauf, Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden.

4) Klassifizierung des Wirkungsmechanismus; Resistenzvermeidung durch Verwendung von Produkten aus verschiedenen Gruppen

5) Anwendung auf derselben Fläche nur alle 2 Jahre

NA = Nachauflaufbehandlung

**Herbizidwirkung:**

+++ sehr gut wirksam

++ gut wirksam

+ schwach/nur im Wachstum gehemmt