

Maul- und Klauen Seuche

Bleiben Sie achtsam!



01 Erkennen der Krankheit



Läsionen im Interdigitalspalt, oft von Lahmheit begleitet.



Vermehrter Speichelfluss und Läsionen im Maul.

Bei Schafen und Ziegen sind die klinischen Anzeichen oft mild und können schwerer zu erkennen sein.

02 Klinische Zeichen

Aborte & plötzlicher Tod bei Neugeborenen

Gewichtsverlust

Verminderte Leistung

Fieber

Rückgang der Milchleistung


Speicheln

Bläschen und Läsionen

Bei Verdacht auf Maul- und Klauenseuche informieren Sie umgehend die örtlichen Behörden und Ihren Tierarzt.



Empfängliche Tiere



Minimieren Sie Kontakte zwischen Ihren Tieren und anderen Nutztieren.

04

Lassen Sie keine Besucher zu Ihren Tieren und vermeiden Sie den Besuch von Gebieten mit anderen Nutztieren.

Transmissions Routen 05

Direkter Tier Kontakt	Der wichtigste Übertragungsweg
Tierische Produkte	Der zweitwichtigste Übertragungsweg ist die Aufnahme von infizierten tierischen Produkten
Mechanisch	Übertragung von Viruspartikel auf leblosen Gegenständen (zb. Schuhe)
Wind	Nicht so häufig, aber möglich, vor allem wenn große Schweinemastbestriebe in der Nähe sind, unter bestimmten Wetterbedingungen. (kühl und feucht)

Weiterführende Infos



EuFMD

KVG

03